結腸・直腸癌　　34レジメン

＜XELOX療法＞　401

・オキサリプラチン	130mg/㎡	day,1	（120分間で投与）
・ゼローダ	1000mg/㎡/回	day,1～15 （day,1,15に注意すること）	食後30分以内

1クール　21日間

＜XELOX+bevacizumab(7.5)療法＞　402

・オキサリプラチン	130mg/㎡	day,1	（120分間で投与）
・ベバシズマブ	7.5mg/kg	day,1	（90分間で投与）
・ゼローダ	1000mg/㎡/回	day,1～15	食後30分以内

1クール　21日間

＜mFOLFOX6療法＞　403

・オキサリプラチン	85mg/㎡	day,1	（120分間で投与）
・レボホリナート	200mg/㎡	day,1	（120分間で投与）
・５－FU	400mg/㎡	day,1	（5分間で投与）
・５－FU	2400mg/㎡	day,1	（46時間で投与）

1クール　14日間

＜FOLFIRI療法＞　404

・イリノテカン	150mg/㎡*	day,1	（120分間で投与）
・レボホリナート	200mg/㎡	day,1	（120分間で投与）
・５－FU	400mg/㎡	day,1	（5分間で投与）
・５－FU	1200mg/㎡	day,1,2	（22時間・24時間）

1クール　14日間

＜bevacizumab(5)＋FOLFIRI療法＞　405

・ベバシズマブ	5mg/kg	day,1	（90分間で投与）
・イリノテカン	150mg/㎡*	day,1	（120分間で投与）
・レボホリナート	200mg/㎡	day,1	（120分間で投与）
・５－FU	400mg/㎡	day,1	（5分間で投与）
・５－FU	1200mg/㎡	day,1,2	（22時間・24時間）

1クール　14日間

＜l-LV+5-FU療法＞　406

・レボホリナート	250mg/㎡	day,1,8,15, 22,29,36	（120分間で投与）
・５－FU	600mg/㎡	day,1,8,15, 22,29,36	（5分間で投与）

1クール　56日間　　補助療法は3クール

＜CPT-11(100)単独療法　A法＞　407

・イリノテカン	100mg/㎡	day,1.8.15	（90分間で投与）

1クール　28日間

＜CPT-11(150)単独療法　B法＞　408

・イリノテカン	150mg/㎡	day,1.15	（90分間で投与）

1クール　28日間

＜CPT-11(100)+S-1療法＞ 409

イリノテカン	100mg/㎡	day,1.15	（90分間で投与）
S-1（p.o.）	80mg/㎡/日	day. 1-14	

1クール　28日間

＜UFT+LV療法＞ 410

・UFT(内服)	300mg/㎡/日	1日3分割	day,1-28
・ロイコボリン（内服）	75mg/body/日	1日3分割	

1クール　35日間　補助療法は5クール

＜CPT-11(100)＋cetuximab(250)療法＞ 411

・イリノテカン	100mg/㎡	day,1,8,15,22	（90分間で投与）
・アービタックス	400mg/㎡	day,1	（120分間で投与）
（2回目以降）	250mg/㎡	day,8,15,22,29,36	（60分間で投与）

1クール　42日間

＜CPT-11(150)＋cetuximab(250)療法＞ 412

・イリノテカン	150mg/㎡	day,1,15,29,50…	（90分間で投与）
・アービタックス	400mg/㎡	day,1	（120分間で投与）
（2回目以降）	250mg/㎡	day,8,15,22,29,36	（60分間で投与）

1クール　49日間

＜cetuximab(250)療法＞ 413

・アービタックス	400mg/㎡	day,1	（120分間で投与）
（2回目以降）	250mg/㎡		（60分間で投与）

1クール　7日間

＜ゼローダ(カペシタビン)療法＞ 414

ゼローダ（カペシタビン）	1250mg/㎡	day,1-14
	1日2回 食後30分	

1クール　21日間　計8クール

＜S-1療法＞ 415

・S-1（p.o.）　80mg/㎡/日

ただし、1.25㎡未満：80mg、1.25～1.5㎡：100mg、1.5㎡以上：120mgとする。

28日間投与、14日間休薬を繰り返す（術後補助療法は1年間）
（オプションとして5日投与2日休薬あるいは14日投与7日休薬）

＜CPT-11(150)＋panitumumab(6)療法＞ 416

・イリノテカン	150mg/㎡	day,1	（90分間で投与）
・ベクティビックス	6mg/kg	day,1	（60分間で投与）

1クール　14日間

＜*panitumumab(6)＋FOLFIRI療法*＞ 417

・ベクティビックス	6mg/kg	day,1	(60分間で投与)
・イリノテカン	150mg/㎡	day,1	(120分間で投与)
・レボホリナート	200mg/㎡	day,1	(120分間で投与)
・5-FU	400mg/㎡	day,1	(5分間で投与)
・5-FU	1200mg/㎡	day,1,2	(22時間・24時間)

1クール　14日間

＜*bevacizumab(5)＋mFOLFOX6療法*＞ 418

・ベバシズマブ	5mg/kg	day,1	(90分間で投与)
・オキサリプラチン	85mg/㎡	day,1	(120分間で投与)
・レボホリナート	200mg/㎡	day,1	(120分間で投与)
・5-FU	400mg/㎡	day,1	(5分間で投与)
・5-FU	2400mg/㎡	day,1	(46時間で投与)

1クール　14日間

＜*cetuximab(250)＋FOLFIRI療法*＞ 419

・アービタックス	400mg/㎡	day,1	(120分間で投与)
(2回目以降)	250mg/㎡	day8	(60分間で投与)
・イリノテカン	150mg/㎡	day,1	(120分間で投与)
・レボホリナート	200mg/㎡	day,1	(120分間で投与)
・5－FU	400mg/㎡	day,1	(5分間で投与)
・5－FU	1200mg/㎡	day,1,2	(22時間・24時間)

1クール　14日間

＜*panitumumab(6)単剤療法*＞ 420

・ベクティビックス	6mg/kg	day,1	(60分間で投与)

1クール　14日間

＜*panitumumab(6)＋mFOLFOX6療法*＞ 421

・ベクティビックス	6mg/kg	day,1	(60分間で投与)
・オキサリプラチン	85mg/㎡	day,1	(120分間で投与)
・レボホリナート	200mg/㎡	day,1	(120分間で投与)
・5-FU	400mg/㎡	day,1	(5分間で投与)
・5-FU	2400mg/㎡	day,1	(46時間で投与)

1クール　14日間

＜*cetuximab(250)＋mFOLFOX6療法*＞ 422

・アービタックス	400mg/㎡	day,1	(120分間で投与)
(2回目以降)	250mg/㎡	day8	(60分間で投与)
・オキサリプラチン	85mg/㎡	day,1	(120分間で投与)
・レボホリナート	200mg/㎡	day,1	(120分間で投与)
・5-FU	400mg/㎡	day,1	(5分間で投与)
・5-FU	2400mg/㎡	day,1	(46時間で投与)

1クール　14日間

＜*bevacizumab(5)＋IRIS療法*＞ 423

・ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	(90分間で投与)
・イリノテカン	100mg/㎡	day,1,15	(90分間で投与)
・S-1(p.o.)	80mg/㎡/日	day. 1-14	

1クール　28日間

＜SOX療法(ACTS-CC 02)＞ 424

・オキサリプラチン	130mg/㎡	day,1	(120分間で投与)
・S-1(p.o.)	80mg/㎡/日	day. 1夕食後-15朝食後	

ただし、1.25㎡未満:80mg、1.25～1.5㎡:100mg、1.5㎡以上:120mgとする。
(day,1,15に注意すること)

1クール　21日間

＜bevacizmab(7.5)+XELIRI療法＞ 425

・イリノテカン	200mg/㎡	day,1	(120分間で投与)
・ベバシズマブ	7.5mg/kg	day,1	(90分間で投与)
・ゼローダ	800mg/㎡/回	day,1～15	食後30分以内

(day,1,15に注意すること)

1クール　21日間

＜bebacizmab+SOX療法＞ 426

・オキサリプラチン	130mg/㎡	day,1	(120分間で投与)
・ベバシズマブ	7.5mg/kg	day,1	(90分間で投与)
・S-1(p.o.)	80mg/㎡/日	day. 1夕食後-15朝食後	

ただし、1.25㎡未満:80mg、1.25～1.5㎡:100mg、1.5㎡以上:120mgとする。
(day,1,15に注意すること)

1クール　21日間

＜bevacizmab+l-LV+5-FU療法＞ 427

・ベバシズマブ	5mg/kg	day,1	(90分間で投与)
・レボホリナート	200mg/㎡	day,1	(120分間で投与)
・5-FU	400mg/㎡	day,1	(5分で投与)
・5-FU	1200mg/㎡	day,1,2	(23時間で投与)

1クール　56日間　　補助療法は3クール

＜bevacizmab+xeloda/S-1療法＞ 428

・ベバシズマブ	7.5mg/kg	day,1	(90分間で投与)
・ゼローダ/S-1		day,1～15	食後30分以内

(day,1,15に注意すること)

1クール　21日間

＜bevacizmab+UFT/UZEL療法＞ 429

・ベバシズマブ	5mg/kg	day,1	(90分間で投与)
・UFT(内服)	300mg/㎡/日	1日3分割	day1-14
・ロイコボリン(内服)	75mg/body/日	1日3分割	

1クール　28日間

＜ramcirumab(8)＋FOLFIRI療法＞ 430

・サイラムザ	8mg/kg	day,1	(60分間で投与)
・イリノテカン	150mg/㎡	day,1	(120分間で投与)
・レボホリナート	200mg/㎡	day,1	(120分間で投与)
・5-FU	400mg/㎡	day,1	(5分間で投与)
・5-FU	1200mg/㎡	day,1,2	(22時間・24時間)

1クール　14日間

＜aflibercept beta(4)＋FOLFIRI療法＞				431
・ ザルトラップ	4mg/kg	day,1	(60分間で投与)	
・ イリノテカン	150mg/㎡	day,1	(120分間で投与)	
・ レボホリナート	200mg/㎡	day,1	(120分間で投与)	
・ 5-FU	400mg/㎡	day,1	(5分間で投与)	
・ 5-FU	1200mg/㎡	day,1,2	(22時間・24時間)	
1クール　14日間				

＜Bmab+FOLFOXIRI療法＞				432
・ ベバシズマブ	5mg/kg	day,1	(90分間で投与)	
・ オキサリプラチン	85mg/㎡	day,1	(120分間で投与)	
・ イリノテカン	165mg/㎡	day,1	(90分間で投与)	
・ レボホリナート	200mg/㎡	day,1	(120分間で投与)	
・ 5-FU	1600mg/㎡	day,1,2	(48時間で投与)	
1クール　14日間				

＜bevacizmab+TAS-102療法＞				433
・ ベバシズマブ	5mg/kg	day,1,15	(90分間で投与)	
・ ロンサーフ		day,1～5,8～12	1日2回　朝夕食後	
1クール　28日間				

＜Bmab+modified FOLFOXIRI療法＞				434
・ ベバシズマブ	5mg/kg	day,1	(90分間で投与)	
・ オキサリプラチン	85mg/㎡	day,1	(120分間で投与)	
・ イリノテカン	150mg/㎡	day,1	(90分間で投与)	
・ レボホリナート	200mg/㎡	day,1	(120分間で投与)	
・ 5-FU	1200mg/㎡	day,1,2	(48時間で投与)	
1クール　14日間				