<u>非小細胞肺癌(NSCLC)</u> 49レジメン

<cbdca(auc6) +ptx(200)療法<="" th=""><th>(CBDCA+PT)</th><th>Y 療注) ゝ</th><th></th><th>1</th></cbdca(auc6)>	(CBDCA+PT)	Y 療注) ゝ		1
・パクリタキセル	200mg/m ²	<u>へ深/女/</u> day.1	(180分間で投与)	'
・カルボプラチン	AUC=6	day.1	(60分間で投与)	
15 11 04 12 18				
1クール 21日間				
<txt(60)療法></txt(60)療法>				2
・ドセタキセル	60mg∕ m i̇́	day.1	(60分で投与)	
1.5 川 0.1 口間				
1クール 21日間				
<cddp(80)+txt(60)療法></cddp(80)+txt(60)療法>				3
・シスプラチン	80mg/ m ²	day.1	(120分間で投与)	
・ドセタキセル	60mg∕m ^²	day.1	(60分間で投与)	
1クール 21日間				
<u> <vnr(25)療法></vnr(25)療法></u>	05 / 2		(F八88→±□. ► \	4
・ナベルビン	25mg∕ m i̇́	day.1,8	(5分間で投与)	
1クール 21日間				
<u><cddp(80)+vnr(25)療法></cddp(80)+vnr(25)療法></u> ・ナベルビン	0 E / m²	-l 1 O	/5八眼云机上\	5
・シスプラチン	25mg/ m 80mg/ m	day.1,8 day.1	(5分間で投与) 120分間で投与)	
	comg/ m	aay. i	120/1 [4] () & 1/	
1クール 21日間				
<i><gem(1000)療法></gem(1000)療法></i>				6
<u>・ ゲムシタビン</u>	1000mg/ m ²	day.1,8	(30分間で投与)	ď
	J	,		
1クール 21日間				
<cddp(80)+gem(1000)療法></cddp(80)+gem(1000)療法>				7
<u> ・ ゲムシタビン</u>	1000mg/ m ²	day.1,8	(30分間で投与)	΄Ι
・シスプラチン	80mg/m²	day.1	(120分間で投与)	
1.5 川 0.1 口間				
1クール 21日間				
<gem(1000)+vnr(25)療法></gem(1000)+vnr(25)療法>				8
・ゲムシタビン	1000mg/ m ²	day.1,8	(30分間で投与)	
・ナベルビン	25mg∕ m i̇́	day.1,8	(5分間で投与)	
1クール 21~28日間				
., ,, = = = = = = = = = = = = = = = = =				
<i><cpt−11(100)療法></cpt−11(100)療法></i>	100 / 2		/00 /\ PP - 17 L \	9
・イリノテカン	100mg∕ m i̇́	day.1,8,15	(90分間で投与)	
1クール 28日間				
<u><cddp(80)+cpt-11(60)療法></cddp(80)+cpt-11(60)療法></u>	00 / 2		(100 /\ BB ~ \ \ \ \ \ \	10
・シスプラチン	80mg/ m 60mg/ m	day.1 day.1,8,15	(120分間で投与) (60分間で投与)	
 ・ イリノテカ` /		uav. I.U. I J	(UU)) F C X - 7 /	
・イリノテカン	oomg/ m	5.5. 3 , 5, . 5		

<s−1(80)+cddp(60)療法></s−1(80)+cddp(60)療法>				11
• S-1 (p.o.)	80mg/ m 2×	day.1 ∼ 21	2週休薬	
・シスプラチン	60mg∕ m i̇́	day.8	(120分間で投与)	
1クール 35日間				
<u><pem(500)療法> 悪性中皮腫レジ</pem(500)療法></u>	ジメンと毎日			12
<u>マアとM(500/猿/スン - 忠任 平及 </u>	<i>500</i> mg/ m i	day.1	(10分間で投与)	12
	555111g/ 111	aay	(10)3 [4] (1)	
1クール 21日間				
		. **		
<u><cddp(75)+pem(500)療法> 悪</cddp(75)+pem(500)療法></u> ・アリムタ	<u>[性中皮腫レジメンと</u> F00/-プ		(10八甲六九上)	13
・シスプラチン	500mg/ m 75mg/ m	day.1 day.1	(10分間で投与) (120分間で投与)	
	/ Jilig/ III	uay. i		
1クール 21日間				
<u><amr(35)単剤療法></amr(35)単剤療法></u>	2		/= /\ PP \!! \- \	14
・カルセド	35mg∕ m i̇́	day.1,2,3	(5分間で投与)	
1クール 21~28日間				
17 70 2119 20日间				
<cbdca(auc5)+pem(500)療法)< td=""><td>> 悪性中皮腫レジ</td><td>ジメンと兼用</td><td></td><td>15</td></cbdca(auc5)+pem(500)療法)<>	> 悪性中皮腫レジ	ジメンと兼用		15
・アリムタ	500mg/m ²	day.1	(10分間で投与)	
・カルボプラチン	AUC=5~6	day.1	(60分間で投与)	
1クール 21日間				
<cbdca(auc4)+gem(1000)療法< td=""><td><i>‡</i> ></td><td></td><td></td><td>16</td></cbdca(auc4)+gem(1000)療法<>	<i>‡</i> >			16
・ゲムシタビン	1000mg/m²	day.1,8	(30分間で投与)	10
・カルボプラチン	AUC=4	day.1	(60分間で投与)	
		-		
1クール 21日間				
CCDCA(AUCE) DTV(200) D				17
<u> <cbdca(auc6) +="" ptx(200)+bev<="" u=""> ・パクリタキセル</cbdca(auc6)></u>	<i>/acizmab(13)療法之</i> 200mg/ m	<u>²</u> day.1	(180分間で投与)	17
・カルボプラチン	AUC=6	day.1 day.1	(60分間で投与)	
・ベバシズマブ	15mg∕kg	day.1	(90分間で投与)	
		-		
1クール 21日間				
CORDON(AUGO) PEN/500) 5	1/4F\:\ =\+			10
<u> <cbdca(auc6)+pem(500)+be< u="">(・アリムタ</cbdca(auc6)+pem(500)+be<></u>	<i>vacızumab(15)類法</i> 500mg/ m i	<u>></u> day.1	(10分間で投与)	18
・カルボプラチン	AUC=6	day.1 day.1	(60分間で投与)	
・ベバシズマブ	15mg∕kg	day.1	(90分間で投与)	
	Jg	-		
1クール 21日間				
	, <i>b</i> # ++ ++ ++ +			
<u><bevacizmab(15)療法 (bevacizm<="" u=""> ・ベバシズマブ</bevacizmab(15)療法></u>	<i>ab維持療法)></i>	ala 1	20八明元机上	19
. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	15mg/kg	day.1	30分間で投与	
1クール 21日間				
1クール 21日間				
1クール 21日間 <td>)療法 (CBDCA -</td> <td>+nab-PTX療法)。</td> <td></td> <td>20</td>)療法 (CBDCA -	+nab-PTX療法)。		20
	100mg∕ m i̇́	day.1.8.15	 (30分間で投与)	20
<cbdca(auc6) +="" nab-ptx(200)<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td>20</td></cbdca(auc6)>				20
<u><cbdca(auc6)+nab-ptx(200)< u=""> ・nab-パクリタキセル</cbdca(auc6)+nab-ptx(200)<></u>	100mg∕ m i̇́	day.1.8.15	 (30分間で投与)	20

<cbdca(auc=5)+s-1(80)療法></cbdca(auc=5)+s-1(80)療法>	•			21
• S-1(内服)	80mg/ m 2×	day1 ~ 14	7日間休薬	
・カルボプラチン	AUC=5	day.1	(60分間で投与)	
 1クール 21日間				
19一ル 21日間				
<u> <pdl-1(240)療法> 悪性中皮腫レ</pdl-1(240)療法></u>	ジメンと兼用			22
・オプジーボ	240mg/body	day.1	(30分以上かけて投与)	
16 11 14 11 11				
1クール 14日間				
<nivolumab(480)療法></nivolumab(480)療法>				22-2
・オプジーボ	480mg/body	day.1	(30分以上かけて投与)	
.,				
1クール 28日間				
<pembrolizumab(200)療法></pembrolizumab(200)療法>				23
・キイトルーダ	200mg/body	day.1	(30分間で投与)	-
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	· · ·	
1クール 21日間				
<damah (400)="" ab="" td="" vi="" waling="" you="" 赤さナト<=""><td></td><td></td><td></td><td>23-2</td></damah>				23-2
<u><pembrolizumab(400)療法></pembrolizumab(400)療法></u> ・キイトルーダ	400mg/body	day.1	(30分間で投与)	23-2
7.1170 7	+oonig/ body	uay. i		
1クール 42日間				
<u><ramucirumab(10)+txt(60)療法></ramucirumab(10)+txt(60)療法></u>	10 /1		(00八田本机上)	24
・サイラムザ・ドセタキセル	10mg/kg 60mg/ m ²	day.1 day.1	(60分間で投与) (60分間で投与)	
1 27 (27)	oomg/ m	day. 1		
1クール 21日間				
	a = rt 1/1 \			
<u><txt(40)+cddp(40)+rt療法 ((<="" u=""> ・ドセタキセル</txt(40)+cddp(40)+rt療法></u>	<i>C<u>D療法)></u></i> 40mg/ m ẩ	day.1,8	(60分間で投与)	25
・シスプラチン	40mg/m²	day.1,8 day.1,8	(60分間で投与)	
		y ,c	(00)3 [1] (1) (3)	
1クール 28日間				
ZA, 1' 1/1000/#2+\				00
<u><atezolizumab(1200)療法></atezolizumab(1200)療法></u> ・テセントリク	1200mg/body	day.1	(60分間で投与)	26
7 22177	1200mg/ body	uay. I		
1クール 21日間				
				<u>'</u>
<u><durvalumab(1500)療法></durvalumab(1500)療法></u>	4500 " :		/00 // BB ~ ±0: + \	27
・イミフィンジ	1500mg/body	day.1	(60分間で投与)	
 1クール 28日間	ただし 12ヵ日間]を超えないこと。		
. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	12120\ 12/J/JIP	, <u>_ </u>		
<pembrolizmab(200)+cddp(75)+pe< td=""><td>M(500)療法></td><td></td><td></td><td>28</td></pembrolizmab(200)+cddp(75)+pe<>	M(500)療法>			28
・アリムタ	500mg/ m ²	day.1	(10分間で投与)	
・シスプラチン	75mg/ m i	day.1	(120分間で投与)	
・キイトルーダ	200mg/body	day.1	(30分間で投与)	
1クール 21日間				

<pembrolizmab(400)+cddp(75)+p< th=""><th>DEM/500)·<u></u></th><th></th><th></th><th>28-2</th></pembrolizmab(400)+cddp(75)+p<>	DEM/500)· <u></u>			28-2
<u> </u>	<u>- EM(500)張宏ン</u> 500mg/m2	day.1.22	(10分間で投与)	20-2
・シスプラチン	75mg/m2	day.1.22 day.1.22	(120分間で投与)	
・キイトルーダ	400mg/body	day.1.22 day.1	(30分間で投与)	
- 41170-3	400ilig/ body	uay. i	(30万间(37)	
1クール 42日間				
1 7 7 7 4 2 日 日				
<pre><pembrolizmab(200)+cbdca(au< pre=""></pembrolizmab(200)+cbdca(au<></pre>	IC5)+PFM(500)療法	>		29
・アリムタ	500mg/m ²	day.1	(10分間で投与)	
・カルボプラチン	AUC=5	day.1	(60分間で投与)	
・キイトルーダ	200mg/body	day.1	(30分間で投与)	
7 1170 7	200mg/ body	uay. i	(30万百) (30万)	
1クール 21日間				
12 70 214181				
<pembrolizmab(400)+cbdca(au< p=""></pembrolizmab(400)+cbdca(au<>	C5)+PEM(500)療法	>		29-2
アリムタ	500mg/m2	 day.1.22	(10分間で投与)	
・カルボプラチン	AUC=5	day.1.22	(60分間で投与)	
・キイトルーダ	400mg/body	day.1.22 day.1	(30分間で投与)	
7 1170 3	TOUING/ DOUY	uay. I		
1クール 42日間				
17 77 千2日旧				
<pembrolizmab(200)+cbdca(au< td=""><td> C6)+PTX(200)療法</td><td>></td><td></td><td>30</td></pembrolizmab(200)+cbdca(au<>	 C6)+PTX(200)療法	>		30
· パクリタキセル	200mg/m²	<u>~</u> day.1	(180分間で投与)	55
・カルボプラチン	AUC=6	day.1	(60分間で投与)	
・キイトルーダ		_		
・キャルーダ	200mg/body	day.1	(30分間で投与)	
1クール 21日間				
「ソール 21日间				
< Pembrolizmah(400)+CBDCΔ(411	IC6)+PTX(200)塘洋	: >		30-2
<pembrolizmab(400)+cbdca(au< td=""><td></td><td></td><td>(180公問で投与)</td><td>30-2</td></pembrolizmab(400)+cbdca(au<>			(180公問で投与)	30-2
・パクリタキセル	200mg/m2	day.1.22	(180分間で投与)	30-2
・ パクリタキセル ・ カルボプラチン	200mg/m2 AUC=6	day.1.22 day.1.22	(60分間で投与)	30-2
・パクリタキセル	200mg/m2	day.1.22		30-2
・パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ	200mg/m2 AUC=6	day.1.22 day.1.22	(60分間で投与)	30-2
・ パクリタキセル ・ カルボプラチン	200mg/m2 AUC=6	day.1.22 day.1.22	(60分間で投与)	30-2
・パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間	200mg/m2 AUC=6 400mg/body	day.1.22 day.1.22 day.1	(60分間で投与)	
・パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間 Pembrolizmab(200)+CBDCA(AUC)	200mg/m2 AUC=6 400mg/body 6) + nab-PTX(100)	day.1.22 day.1.22 day.1 <u>\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ </u>	(60分間で投与) (30分間で投与)	30-2
・パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間 Pembrolizmab(200)+CBDCA(AUC) ・nab-パクリタキセル	200mg/m2 AUC=6 400mg/body 6) + nab-PTX(100) 100mg/m²	day.1.22 day.1.22 day.1 <u>療法></u> day.1.8.15	(60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与)	
・パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間 Pembrolizmab(200)+CBDCA(AUC6 ・nab-パクリタキセル ・カルボプラチン	200mg/m2 AUC=6 400mg/body 6) + nab-PTX(100)3 100mg/m ² AUC=6	day.1.22 day.1.22 day.1 <u>療法></u> day.1.8.15 day.1	(60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (60分間で投与)	
・パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間 Pembrolizmab(200)+CBDCA(AUC) ・nab-パクリタキセル	200mg/m2 AUC=6 400mg/body 6) + nab-PTX(100) 100mg/m²	day.1.22 day.1.22 day.1 <u>療法></u> day.1.8.15	(60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与)	
・パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間 Pembrolizmab(200)+CBDCA(AUC) ・nab-パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ	200mg/m2 AUC=6 400mg/body 6) + nab-PTX(100)3 100mg/m ² AUC=6	day.1.22 day.1.22 day.1 <u>療法></u> day.1.8.15 day.1	(60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (60分間で投与)	
・パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間 Pembrolizmab(200)+CBDCA(AUC6 ・nab-パクリタキセル ・カルボプラチン	200mg/m2 AUC=6 400mg/body 6) + nab-PTX(100)3 100mg/m ² AUC=6	day.1.22 day.1.22 day.1 <u>療法></u> day.1.8.15 day.1	(60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (60分間で投与)	
・パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間 Pembrolizmab(200)+CBDCA(AUC6 ・nab-パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 21日間	200mg/m2 AUC=6 400mg/body 6) + nab-PTX(100)3 100mg/m ² AUC=6 200mg/body	day.1.22 day.1.22 day.1 <u>療法之</u> day.1.8.15 day.1 day.1	(60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (60分間で投与)	31
・パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間 Pembrolizmab(200)+CBDCA(AUC6 ・nab-パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 21日間 Pembrolizmab(400)+CBDCA(AUC6	200mg/m2 AUC=6 400mg/body 6) + nab-PTX(100); 100mg/m AUC=6 200mg/body	day.1.22 day.1.22 day.1 <u>療法</u> day.1.8.15 day.1 day.1	(60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (60分間で投与) (30分間で投与)	
・パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間 Pembrolizmab(200)+CBDCA(AUC6 ・nab-パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 21日間	200mg/m2 AUC=6 400mg/body 6) + nab-PTX(100)3 100mg/m ² AUC=6 200mg/body	day.1.22 day.1.22 day.1 <u>療法之</u> day.1.8.15 day.1 day.1	(60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (60分間で投与) (30分間で投与)	31
・パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間 Pembrolizmab(200)+CBDCA(AUCE) ・nab-パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 21日間 Pembrolizmab(400)+CBDCA(AUCE) ・nab-パクリタキセル	200mg/m2 AUC=6 400mg/body 6) + nab-PTX(100)3 100mg/m ² AUC=6 200mg/body 6) + nab-PTX(100)3 100mg/m2	day.1.22 day.1.22 day.1 day.1.8.15 day.1 day.1	(60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与)	31
・パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間 Pembrolizmab(200)+CBDCA(AUC6 ・nab-パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 21日間 Pembrolizmab(400)+CBDCA(AUC6 ・nab-パクリタキセル ・カルボプラチン	200mg/m2 AUC=6 400mg/body 6) +nab-PTX(100)3 100mg/m³ AUC=6 200mg/body 100mg/m2 AUC=6	day.1.22 day.1.22 day.1 <u>療法></u> day.1.8.15 day.1 day.1	(60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (9.36 (30分間で投与) (60分間で投与)	31
・パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間 Pembrolizmab(200)+CBDCA(AUCE) ・nab-パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 21日間 Pembrolizmab(400)+CBDCA(AUCE) ・nab-パクリタキセル	200mg/m2 AUC=6 400mg/body 6) + nab-PTX(100)3 100mg/m ² AUC=6 200mg/body 6) + nab-PTX(100)3 100mg/m2	day.1.22 day.1.22 day.1 day.1.8.15 day.1 day.1	(60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与)	31
・パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間 Pembrolizmab(200)+CBDCA(AUCE ・nab-パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 21日間 Pembrolizmab(400)+CBDCA(AUCE ・nab-パクリタキセル ・カルボプラチン ・カルボプラチン ・キイトルーダ	200mg/m2 AUC=6 400mg/body 6) +nab-PTX(100)3 100mg/m³ AUC=6 200mg/body 100mg/m2 AUC=6	day.1.22 day.1.22 day.1 <u>療法></u> day.1.8.15 day.1 day.1	(60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (9.36 (30分間で投与) (60分間で投与)	31
・パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間 Pembrolizmab(200)+CBDCA(AUC6 ・nab-パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 21日間 Pembrolizmab(400)+CBDCA(AUC6 ・nab-パクリタキセル ・カルボプラチン	200mg/m2 AUC=6 400mg/body 6) +nab-PTX(100)3 100mg/m³ AUC=6 200mg/body 100mg/m2 AUC=6	day.1.22 day.1.22 day.1 <u>療法></u> day.1.8.15 day.1 day.1	(60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (9.36 (30分間で投与) (60分間で投与)	31
・パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間 Pembrolizmab(200)+CBDCA(AUCE ・nab-パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 21日間 Pembrolizmab(400)+CBDCA(AUCE ・nab-パクリタキセル ・カルボプラチン ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間	200mg/m2 AUC=6 400mg/body 6) + nab-PTX(100); 100mg/m AUC=6 200mg/body 100mg/m2 AUC=6 400mg/body	day.1.22 day.1.22 day.1 <u>寮法></u> day.1.8.15 day.1 day.1	(60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与)	31-2
・パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間 Pembrolizmab(200)+CBDCA(AUC6) ・nab-パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 21日間 Pembrolizmab(400)+CBDCA(AUC6) ・nab-パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間 <cbdca(auc6)+ptx(200)+bevo< td=""><td>200mg/m2 AUC=6 400mg/body 6) +nab-PTX(100); 100mg/m² AUC=6 200mg/body 100mg/m2 AUC=6 400mg/body</td><td>day.1.22 day.1.22 day.1 <u>療法></u> day.1.8.15 day.1 day.1</td><td>(60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与)</td><td>31</td></cbdca(auc6)+ptx(200)+bevo<>	200mg/m2 AUC=6 400mg/body 6) +nab-PTX(100); 100mg/m² AUC=6 200mg/body 100mg/m2 AUC=6 400mg/body	day.1.22 day.1.22 day.1 <u>療法></u> day.1.8.15 day.1 day.1	(60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与)	31
・パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間 Pembrolizmab(200)+CBDCA(AUC6) ・nab-パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 21日間 Pembrolizmab(400)+CBDCA(AUC6) ・nab-パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間 <cbdca(auc6)+ptx(200)+beve td="" ・パクリタキセル="" ・パクリタキセル<=""><td>200mg/m2 AUC=6 400mg/body 6) + nab-PTX(100)3 100mg/m AUC=6 200mg/body 100mg/m2 AUC=6 400mg/body</td><td>day.1.22 day.1.22 day.1 day.1 day.1 day.1 day.1 day.1.22 day.1.22 day.1.22</td><td>(60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与)</td><td>31-2</td></cbdca(auc6)+ptx(200)+beve>	200mg/m2 AUC=6 400mg/body 6) + nab-PTX(100)3 100mg/m AUC=6 200mg/body 100mg/m2 AUC=6 400mg/body	day.1.22 day.1.22 day.1 day.1 day.1 day.1 day.1 day.1.22 day.1.22 day.1.22	(60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与)	31-2
・パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間 Pembrolizmab(200)+CBDCA(AUC6 ・nab-パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 21日間 Pembrolizmab(400)+CBDCA(AUC6 ・nab-パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間 <cbdca(auc6)+ptx(200)+beve td="" ・カルボプラチン="" ・カルボプラチン<="" ・パクリタキセル=""><td>200mg/m2 AUC=6 400mg/body 6) + nab-PTX(100)3 100mg/m³ AUC=6 200mg/body 100mg/m2 AUC=6 400mg/body</td><td>day.1.22 day.1.22 day.1 day.1 day.1 day.1 day.1.22 day.1.22 day.1 day.1</td><td>(60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与)</td><td>31-2</td></cbdca(auc6)+ptx(200)+beve>	200mg/m2 AUC=6 400mg/body 6) + nab-PTX(100)3 100mg/m³ AUC=6 200mg/body 100mg/m2 AUC=6 400mg/body	day.1.22 day.1.22 day.1 day.1 day.1 day.1 day.1.22 day.1.22 day.1 day.1	(60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与)	31-2
・パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間 Pembrolizmab(200)+CBDCA(AUC6 ・nab-パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 21日間 Pembrolizmab(400)+CBDCA(AUC6 ・nab-パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間 	200mg/m2 AUC=6 400mg/body 6) + nab-PTX(100) 100mg/m AUC=6 200mg/body 100mg/m2 AUC=6 400mg/body acizmab(15)+Atezolo 200mg/m AUC=6 15mg/kg	day.1.22 day.1.22 day.1 day.1.8.15 day.1 day.1 day.1.22 day.1.22 day.1 day.1 day.1	(60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (60分間で投与) (90分間で投与)	31-2
・パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間 Pembrolizmab(200)+CBDCA(AUC6 ・nab-パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 21日間 Pembrolizmab(400)+CBDCA(AUC6 ・nab-パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間 <cbdca(auc6)+ptx(200)+beve td="" ・カルボプラチン="" ・カルボプラチン<="" ・パクリタキセル=""><td>200mg/m2 AUC=6 400mg/body 6) + nab-PTX(100)3 100mg/m³ AUC=6 200mg/body 100mg/m2 AUC=6 400mg/body</td><td>day.1.22 day.1.22 day.1 day.1 day.1 day.1 day.1.22 day.1.22 day.1 day.1</td><td>(60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与)</td><td>31-2</td></cbdca(auc6)+ptx(200)+beve>	200mg/m2 AUC=6 400mg/body 6) + nab-PTX(100)3 100mg/m³ AUC=6 200mg/body 100mg/m2 AUC=6 400mg/body	day.1.22 day.1.22 day.1 day.1 day.1 day.1 day.1.22 day.1.22 day.1 day.1	(60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与)	31-2
・パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間 Pembrolizmab(200)+CBDCA(AUC6 ・nab-パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 21日間 Pembrolizmab(400)+CBDCA(AUC6 ・nab-パクリタキセル ・カルボプラチン ・キイトルーダ 1クール 42日間 	200mg/m2 AUC=6 400mg/body 6) + nab-PTX(100) 100mg/m AUC=6 200mg/body 100mg/m2 AUC=6 400mg/body acizmab(15)+Atezolo 200mg/m AUC=6 15mg/kg	day.1.22 day.1.22 day.1 day.1.8.15 day.1 day.1 day.1.22 day.1.22 day.1 day.1 day.1	(60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (60分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (30分間で投与) (60分間で投与) (90分間で投与)	31-2

Atezolizumab(1200)+CBDCA(AUC6)	±nah-DTX/100)±			33
• nab-パクリタキセル		я.∠д.∠ day.1.8.15	(30分間で投与)	33
・カルボプラチン	100mg/m [†]	=		
	AUC=6	day.1	(60分間で投与)	
・テセントリク	1200mg/body	day.1	(60分間で投与)	
1クール 21日間				
<nivolumab(360)+ipilimumab(1)療法)< td=""><td>></td><td></td><td></td><td>34</td></nivolumab(360)+ipilimumab(1)療法)<>	>			34
・オプジーボ	360mg/body	day.1.22	(30分以上かけて投与)	
・ヤーボイ	1mg/kg	day.1	(30分間で投与)	
	1111 5 / 115	day. i		
1 5 U 10 D BB				
1クール 42日間				
<nivolumab(240)+ipilimumab(1)療法)< td=""><td></td><td></td><td></td><td>34-2</td></nivolumab(240)+ipilimumab(1)療法)<>				34-2
・オプジーボ	360mg/body	day.1.15.29	(30分以上かけて投与)	
・ヤーボイ	1mg/kg	day.1	(30分間で投与)	
	3 3	•		
1クール 42日間				
17 // 4211 11				
Z : 1 1/200\: " 1/1\: 225	DD/75\	<i>歯</i> おく		0.5
<nivolumab(360)+ipilimumab(1)+cdl< p=""></nivolumab(360)+ipilimumab(1)+cdl<>			(40/) BB 45 1	35
・アリムタ	500mg/m2	day.1.22	(10分間で投与)	
・シスプラチン	75 mg/m2	day.1.22	(120分間で投与)	1
・オプジーボ	360mg/body	day.1.22	(30分以上かけて投与)	
・ヤーボイ	1mg/kg	day.1	(30分間で投与)	
1		y	(30)	i
1クール 42日間				
17 70 年2日间				
Znicolomok (260) (Iniliano and A) (CDE	OCA/ALICE) (DEM	/500)病:ナト		26
<nivolumab(360)+ipilimumab(1)+cbd< p=""></nivolumab(360)+ipilimumab(1)+cbd<>			(40八田一切上)	36
・アリムタ	500mg/m2	day.1.22	(10分間で投与)	
・カルボプラチン	AUC=5-6	day.1.22	(60分間で投与)	
・オプジーボ	360mg/body	day.1.22	(30分以上かけて投与)	
・ヤーボイ	1mg/kg	day.1	(30分間で投与)	
	• •	_		i
1ク―ル 42日間				
17 70 12 11 [1]				
≤nivolumab(360)+Ipilimumab(1)+CBD	OCA/AUC6)+DTY	(/200) 広注 \		37
			(100人) 関 示	3/
・パクリタキセル	200mg/m2	day.1.22	(180分間で投与)	
・カルボプラチン	AUC=6	day.1.22	(60分間で投与)	
・オプジーボ	360mg/body	day.1.22	(30分以上かけて投与)	
・ヤーボイ	1mg/kg	day.1	(30分かけて投与)	
1クール 42日間				
<cddp(75)+pem(500)+bevacizum< td=""><td>ah(15)痞法></td><td></td><td></td><td>38</td></cddp(75)+pem(500)+bevacizum<>	ah(15)痞法>			38
・アリムタ		day.1	(10分間で投与)	30
	500mg/m2	=		
・シスプラチン	75mg/m2	day.1	(90分間で投与)	
・ベバシズマブ	15mg∕kg	day.1	(90分間で投与)	
1クール 21日間				
<ramucirumab(10)+erlotinib療法></ramucirumab(10)+erlotinib療法>				39
・サイラムザ	10mg/kg	day.1	(60分間で投与)	1
・タルセバ	150mg	1日1回	連日	
	Tooms	· H · E	Æ H	
16 11 14 1 18				- 1
1クール 14日間				

く	/ ロエン(赤き)へ			40
<u><nab-ptx(100)療法 (cbdca+)<="" u=""> ・nab−パクリタキセル</nab-ptx(100)療法></u>	<i>nab-P1X猿法)></i> 100mg/m2	day.1.8.15	(30分間で投与)	40
- nab-ハッッタギゼル	TOOHIG/ MZ	uay. 1.6.15	(30万间で投事)	
1クール 21日間				
17 7V ZIG[8]				
<cbdca(auc2)+ptx(40)+rad療< td=""><td>(法)</td><td></td><td></td><td>50</td></cbdca(auc2)+ptx(40)+rad療<>	(法)			50
・パクリタキセル	<u>∕40</u> mg/ m i	day.1	(60分間で投与)	"]
・カルボプラチン	AUC=2	day.1	(60分間で投与)	
		-	(==75)(3 = 32(3)	
1クール 7日間				
<u>小細胞肺癌(SCLC)</u>		10レジメン		
<u>·I призили (UULU)</u>		.0000		
<00000/00)/ VD 10/100) 療けり				101
<u><cddp(80)+vp-16(100)療法></cddp(80)+vp-16(100)療法></u> ・シスプラチン	80mg∕ m i̇́	dou 1	(120分間で投与)	101
・ベプシド	80mg/111 100mg/ m	day.1 day.1,2,3	(120分間で投与)	
- 11/2/1	Toomig/ III	uay. 1,2,5	(120万间(改子)	
1クール 21日間				
17 70 214 [8]				
<cbdca(auc5)+vp−16(100)据< td=""><td>·····································</td><td></td><td></td><td>102</td></cbdca(auc5)+vp−16(100)据<>	·····································			102
・カルボプラチン	AUC=5	day.1	(60分間で投与)	
・ベプシド	100mg/ m ²	day.1,2,3	(120分間で投与)	
	O	3 , ,		
1クール 21日間				
<i><cddp(60)+cpt−11(60)療法></cddp(60)+cpt−11(60)療法></i>				103
・シスプラチン	60mg∕ m ੍ਰੈ	day.1	(120分間で投与)	
・イリノテカン	60mg∕ m i̇́	day.1,8,15	(60分間で投与)	
1 to 11 a a a a a a a				
1クール 28日間				
/CDT 11/100)				104
<u><cpt-11(100)単剤療法></cpt-11(100)単剤療法></u> ・イリノテカン	100mg/ m ²	day.1,8,15	(90分間で投与)	104
- 1,77,732	Toomig/ III	uay. 1,0,10	(90万间) (技子)	
1クール 28日間				
17 77 2011				
<amr(35)単剤療法></amr(35)単剤療法>				105
・カルセド	35mg∕ m i̇́	day.1,2,3	(5分間で投与)	
		3 , _ , _	(35)	
1クール 21~28日間				
<u><tpt(1)療法></tpt(1)療法></u>				106
・ハイカムチン	1mg∕ m i̇́	day.1−5	(30分間で投与)	
1クール 21日間				
Z4. " ((1000) 077 01(1111		•+ <		
 Atezolizumab(1200)+CBDCA(AUCS)			/00八目目 	107
・テセントリク	1200mg/body	day.1	(60分間で投与)	
・カルボプラチン ・ベプシド	AUC=5	day.1	(60分間で投与)	
. ハノント	100mg∕ m i̇́	day.1,2,3	(120分間で投与)	
1クール 21日間				
1クール 21日間				

<durvalumab (1500)+cddp(80)+<="" p=""></durvalumab>	<i>VP−16(100)療法></i>			108
・ イミフィンジ ・ シスプラチン ・ ベプシド	1500mg/body 80mg/m2 100mg/m2	day.1 day.1 day.1,2,3	(60分かけて) (120分かけて) (120分かけて)	
1クール 21日間				

<durvalmab(1500)+cbdca(auc< p=""></durvalmab(1500)+cbdca(auc<>	<i>6)+VP−16(100)療法」</i>	<u>></u>		109
・ イミフィンジ ・ カルボプラチン ・ ベプシド	1500mg/body AUC=6 100mg/m2	day.1 day.1 day.1,2,3	(60分かけて) (60分かけて) (120分かけて)	
1クール 21日間				

<durvalumab(1500)療法></durvalumab(1500)療法>				110
・イミフィンジ	1500mg/body	day.1	(60分間で投与)	
		-		
1クール 28日間				

縦隔腫瘍 1レジメン

<cddp(20)+vp-16(100)+blm(30)< th=""><th>療法 (BEP療法))</th><th>></th><th></th></cddp(20)+vp-16(100)+blm(30)<>	療法 (BEP療法))	>	
・シスプラチン ・ベプシド	20mg/ m 100mg/ m	day.1,2,3,4,5 day.1,2,3,4,5	(60分間かけて) (120分間かけて)
・ブレオ	30mg/body	day.2,9,16	(緩徐に静注)
1クール 21日間			