

膵臓癌

7レジメン

<u><GEM療法></u>				1001
・ ゲムシタビン	1000mg/m ²	day.1,8,15	(30分間で投与)	
1クール 28日間				

<u><S-1療法></u>				1002
・ S-1 (p.o.)	80mg/m ² /日			
ただし、1.25m ² 未満:80mg、1.25~1.5m ² :100mg、1.5m ² 以上:120mgとする。				
28日間投与、14日間休薬を繰り返す(術後補助療法は1年間)				
(オプションとして5日投与2日休薬あるいは14日投与7日休薬)				

<u><GEM+S-1療法></u>				1004
・ ゲムシタビン	1000mg/m ²	day.1,8	(30分間で投与)	
・ S-1	60mg/m ²	day.1~14	分2	
1クール 21日間				

<u><FOLFIRINOX療法></u>				1005
・ オキサリプラチン	85mg/m ²	day.1	(120分間で投与)	
・ イリノテカン	180mg/m ²	day.1	(90分間で投与)	
・ レボホリナート	200mg/m ²	day.1	(120分間で投与)	
・ 5-FU	400mg/m ²	day.1	(5分間で投与)	
・ 5-FU	2400mg/m ²	day.1	(46時間で投与)	
1クール 14日間				

<u><GEM+nab-PTX療法></u>				1006
・ アブラキサン	125mg/m ²	day.1,8,15	(30分間で投与)	
・ ゲムシタビン	1000mg/m ²	day.1,8,15	(30分間で投与)	
1クール 28日間				

<u><mFOLFIRINOX療法></u>				1007
・ オキサリプラチン	85mg/m ²	day.1	(120分間で投与)	
・ イリノテカン	150mg/m ²	day.1	(90分間で投与)	
・ レボホリナート	200mg/m ²	day.1	(120分間で投与)	
・ 5-FU	2400mg/m ²	day.1	(46時間で投与)	
1クール 14日間				

<u><MM-398+5FU/LV療法></u>				1009
・ オニバイド	70mg/m2*	day.1	(90分間で投与)	
・ レボホリナート	200mg/m2	day.1	(120分間で投与)	
・ 5-FU	1200mg/m2	day.1,2	(23時間)	
1クール 14日間				

胆道癌

7レジメン

<u><GEM療法></u>				1001
・ ゲムシタビン	1000mg/m ²	day.1,8,15	(30分間で投与)	
1クール 28日間				
<u><S-1療法></u>				1002
・ S-1(p.o.)	80mg/m ² /日			
ただし、1.25m ² 未満:80mg、1.25~1.5m ² :100mg、1.5m ² 以上:120mgとする。				
28日間投与、14日間休薬を繰り返す(術後補助療法は1年間) (オプションとして5日投与2日休薬あるいは14日投与7日休薬)				
<u><GEM(1000)+CDDP(25)療法 (GC療法)></u>				1003
・ ゲムシタビン	1000mg/m ²	day.1,8	(30分間で投与)	
・ シスプラチン	25mg/m ²	day.1,8	(60分間で投与)	
1クール 21日間				
<u><GEM+S-1療法></u>				1004
・ ゲムシタビン	1000mg/m ²	day.1,8	(30分間で投与)	
・ S-1	60mg/m ²	day.1~14	分2	
1クール 21日間				
<u><GEM(1000)+CDDP(25)+S-1療法 (GCS療法)></u>				1008
・ ゲムシタビン	1000mg/m ²	day.1	(30分間で投与)	
・ シスプラチン	25mg/m ²	day.1	(60分間で投与)	
・ S-1	80mg/m ²	day.1~7	分2	
1クール 14日間				
<u><Durvalumab(1500)+GEM(1000)+CDDP(25)療法></u>				1010
・ デュルバルマブ	1500mg/body	day.1	(60分間で投与)	
・ ゲムシタビン	1000mg/m ²	day.1,8	(30分間で投与)	
・ シスプラチン	25mg/m ²	day.1,8	(60分間で投与)	
1クール 21日間 最大8クールまで(維持療法は28日間)				
<u><Pembrolizumab(200)+GEM(1000)+CDDP(25)療法></u>				1011
・ キイトルーダ	200mg/body	day.1	(30分間で投与)	
・ ゲムシタビン	1000mg/m ²	day.1,8	(30分間で投与)	
・ シスプラチン	25mg/m ²	day.1,8	(60分間で投与)	
1クール 21日間 シスプラチンの併用は最大8クールまで				